

DISPLASIA DE CODOS

Qué es la displasia de codos en cánidos:

http://www.cirurgiaveterinaria.es/productos/resultados_12184_0_1.html

Valoración de resultados:

La mayoría de los criadores españoles de Golden retriever enviamos nuestras radiografías para la evaluación de las articulaciones de nuestros goldens a AVEPA (Asociación de veterinarios españoles www.avepa.org) o a la BVA (British Veterinary Association www.bva.co.uk).



El dictamen se encuadrará en la siguiente clasificación, siguiendo la norma del IEWG (Grupo Internacional de Trabajo sobre Displasia de Codo):

0: Sin signos de artrosis. Buena congruencia articular.

1: Artrosis leve (osteofitos de menos de 2 mm. , esclerosis ligera de la escotadura troclear) , y/o leve incongruencia articular.

2: Artrosis moderada (osteofitos entre 2-5 mm. , esclerosis marcada), y/o incongruencia articular obvia.

3: Artrosis severa (osteofitos de más de 5 mm.), y/o evidencia de enfermedad primaria (Proceso Ancóneo No Unido, Proceso Coronoides Fragmentado, OCD Cóndilo Humeral, Mineralización de Tejidos Blandos Caudal al Cóndilo, etc).



El sistema de gradación es simple:

0 = Normal
1 = Signos de displasia muy leves
2 = Displasia moderada o lesiones primarias

3 = Displasia grave

Para un conocimiento más exhaustivo:

http://www.bva.co.uk/uploadedFiles/Content/Canine_Health_Schemes/Elbow_Scheme/CHS-elbow-dysplasia-feb-2014.pdf